

# 预防青少年违法犯罪 做好未成年人保护工作



4月16日,石景山区2015年预防青少年违法犯罪暨未成年人保护工作会成功召开。区委常委、组织部部长晋秋红,团市委权益部部长李海娟出席会议。区综治委预防青少年违法犯罪专项组、区未成年人保护委员会

各成员单位主管领导及联络员参加了此次会议。会上,团区委书记杨俊峰对2014年全区未保、预防工作进行了系统总结,并就2015年的工作重点进行了部署和说明。区法院少年庭负责同志从未成年人司法保

护、审判职能延伸、青少年法制宣传教育等方面分享了未成人保护工作的经验做法。金顶街街道未保预防专职联络员结合辖区基本情况,从青少年宣传教育、社区青少年服务、校园周边综合治理等方面介绍了关爱帮扶青少年健康成长的相关经验。

李海娟代表首都综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室、市未成年人保护委员会办公室讲话,对石景山区过往未保预防工作给予肯定的同时,就如何统筹预青未保两个平台、推广优秀典型经验、做好个案帮扶等方面部署了下一阶段的工作任务。

晋秋红在讲话中要求区预青组、未保委各成员单位充分发挥职能优势,增强责

任意识,在我区未保预防制度建设、重点工作推动等方面做出新成绩,以切实有效的工作举措,帮助广大青少年实现成才发展的自身梦想。

此次工作会对于及时总结工作经验,系统谋划部署全年工作具有重要意义。各成员单位纷纷表示,将进一步贯彻会议要求,按照任务分工,创新工作、积极履职,在完善未成年人涉诉保护体系建设、推动重点青少年群体服务管理、开展预青未保基础工作等方面做出新成绩,为全区广大青少年健康成长保驾护航。

崔凯



青春石景山

## 简讯

● 4月20日,由北京市社会建设专项资金支持,北京书画协会与石景山区联合举办的“翰墨书香 情系社区”公益书画展在苹果园通景大厦开展。北京书画协会自2014年开始在我区老山、苹果园和杨庄等社区举办了多期书画交流活动,在社区普及书画知识,培养扶持书画爱好者,受到居民热情欢迎。为展示书画交流的成果,举办了这次书画展,据悉,展出时间为4月20日~4月26日。 刘会生

● 2015年,石景山区档案局(馆)将组织专业人员对重点建设项目、生态文明、文化生活等进行拍摄,完整记录、留存石景山在发展中的城市变迁过程,积极为区域高端绿色发展服务。将依据口述档案征集工作三年规划,开展“抗战史”、农业农村系列口述资料征集工作;结合房屋征收工作,征集散落在个人手中的区情区史资料;开展馆际间档案资源交流与共享,将石景山区划变更、历史变迁、工业变革等方面的档案资料复制进馆。 王欢 魏葳

● 2015年一季度,我区全社会投资完成31.6亿元,同比增长10.6%。今年,在房地产开发投资的拉动下,1~3月全社会投资再创新高,突破30亿大关,同比增长10.6%。商业类项目成为促使房地产投资增长主力军,一季度,我区19个在建房地产开发项目中有8个属于商业类项目,一季度实现投资14.1亿元,占房地产开发投资比重六成多。 刘欣

## 感染性腹泻科普知识

**了解感染性腹泻病**  
感染性腹泻(也称急性胃肠炎)系指各种病原体肠道感染而引起的腹泻。根据腹泻的持续时间长短,可将其分为急性(<14天),持续性(14~29天)或慢性(≥30天)。病原体主要包括细菌、病毒、寄生虫和真菌等。其染病途径大致相同,主要“病从口入”即粪-口传播,少数由个体接触传播和(或)呼吸道飞沫传播(诸如病毒等),但是仍然有些病例病原体的实际传播途径不明。不同感染接种剂量直接影响疾病的传播方式和易感性。发病机制为毒素和(或)病原体直接侵犯胃肠道黏膜而致病。其临床表现均可有腹痛、腹泻,并可有发热、恶心、呕吐等症状。最后确诊须依赖病原学检

查。各种腹泻处理原则亦相似,但不同病原体引起的腹泻,在流行病学、发病机制、临床表现及治疗上又有不同特点。  
已知引起感染性腹泻的病原体有数十种之多,多数为细菌性和病毒性腹泻。  
全年均可发病,具有明显季节高峰,细菌感染性腹泻一般夏秋季节多发,而病毒感染性腹泻等则以秋冬季节发病较多。  
某些细菌和病毒可在婴幼儿群体中引起暴发流行。  
**感染性腹泻病的传播**  
感染性腹泻病主要经食物或水通过消化道传播,也可经日常生活接触传播。  
食用不洁食物或饮用不洁的水可造成感染。  
与腹泻病人、动物密切接触

也可能被感染。  
食源性或水源性感染常可引起集体发病。  
**感染性腹泻的主要症状**  
感染性腹泻病的主要症状为腹泻,严重者可出现脱水等状况。  
每日大便次数超过3次,可为稀便或水样便,也可为粘液便、脓血便或血便,可伴有恶心、呕吐、腹痛、发热、食欲不振及全身不适。  
病情严重者,常并发脱水、酸中毒、电解质紊乱、休克等。  
**感染性腹泻的治疗**  
感染性腹泻病的治疗主要为预防脱水、治疗脱水和对症治疗,不必禁食,补液以口服为主。鼓励进食营养丰富、且易消化的食物,并加一些蔬菜、水果

等。对于吃母乳的婴儿除继续母乳喂养外,可以添加辅助流质饮食(如米汤等),流质饮食中可加适量盐。  
一般不建议使用止泻药和止吐药。  
能口服者尽量使用口服补液盐补液,不能口服者或腹泻导致严重脱水者,应尽快到医院接受静脉输液。  
抗菌药物的使用应听从专业医生的建议,不可乱用抗菌药物。  
**积极预防感染性腹泻病**  
预防感染性腹泻病的关键是把住“病从口入”关,搞好环境卫生、食品卫生和个人卫生。  
搞好环境卫生:管理好水源、粪便,消灭苍蝇。  
搞好食品卫生:生吃蔬菜瓜

果要洗干净,不喝生水、不吃腐烂不洁的食物。食物要煮熟煮透,剩菜剩饭要加热后食用,生熟食品分开放置,夏季注意凉拌菜卫生,防止苍蝇叮爬。厨房用具应生熟分开,进食包装、罐头等食品前应注意保质期,不吃过期食物。  
搞好个人卫生:饭前便后要洗手。婴幼儿的玩具应定期清洗、消毒,避免病菌污染玩具而感染。



社会主义 **核 心** 价值观

**富强 民主 文明 和谐**  
**自由 平等 公正 法治**  
**爱国 敬业 诚信 友善**

中国 **梦**  
我的

