

摄影/郭纪明

边角沓晃春钓鲫

山东沂南 邹思全

近几年来，春天的天气出奇的“好”，除了晴天还是晴天，下雨的天气已经很少出现了。2012年春天，我地只下了一场小雨。因雨水稀少，晴好天多，刮大风的天多，天气变得干旱、干燥，导致阴霾天、沙尘暴等能见度低的天气频繁出现。因春种抗旱用水持续增加，导致水位大幅度下降，鱼也变得越来越不好钓，连续出钓大小水库共十余次，也没能钓上多少鱼。

在又一次出钓高湖水库时，因去的晚，好钓位已经没有了，就放下渔具包，在水库边转了转。转到东边一块麦田边时，发现一个20多平方米的小水坑，在土坑中间有一个宽不足1米的缺口（看不见底）和大水面相连。我观察发现水坑里的水明显比外面的水浑一些，还不时有水泡冒出来，里面肯定有鱼。

既来之则安之，既然没有好位置可钓，就在这个小水坑里找一下感觉。因面积太小，只好使用2.7米手竿，1号主线，0.6号子线，2号袖钩，一试水深只有半米，就换上一支15厘米长的小浮漂，开了一份浓腥型拉饵，连搓带拉20多竿打下去后，浮漂出现一个抖动动作，扬竿中一尾大马口，在接连钓获4尾马口后，浮漂一个半目下顿动作，扬竿中一尾100克重的鲫鱼。之后，连续有鲫鱼和大马口咬钩。虽然鱼不大，却钓得很过瘾。钓到下午3点多钟，鱼也不咬钩了，就收竿。在这个不起眼的小水坑里，我竟然钓获2000多克鲫鱼和马口。来到其他钓友钓鱼的地方，询

问一下成绩，最好的也只有5尾小鲫鱼的收获，还有2位光荣的参加了“空军”。

事隔三天，我来到一个野塘。因去年秋汛大，导致水库水位超过警戒线，水库开闸放水，因水势太大，能钓鱼的一道石坝子被大水冲垮，仅有的几个钓位也被早来的钓友所占据。只好来到对岸一个长10多米，宽不足3米的小汉子处。因水面太窄，里面还有不少枯芦苇，就使用一根废竿改造的2米手竿，1号主线，0.6号子线，2号白狐钩，挂红蚯蚓，水深1米左右，我是这儿点一下，那儿钓一竿，走钓与逗钓法相结合，却不时拉上尾大鲫鱼。而在对岸的老刘和张老师他们虽然占据着优势位置，却很少有鱼咬钩，每人只有三五尾小鲫鱼的收获，我却钓获200克以上的大鲫鱼11尾，最大一尾重650克。

3月21日，天气晴，气温6~22摄氏度，在鸡关峪水库，更是出现了“奇迹”。我、老爸、小侄子和高老师，在一个长七八十米、宽二十多米的大沟汊里选点下竿，水深基本在2.5米左右。前几天我们在这儿钓了不少大鲫鱼，今天可就出怪事了，鲫鱼不咬钩不说，就是小麦穗也不闹钩。两个小时下去了，就我钓上一尾小马口。钓到1点钟，还是这一尾马口鱼的收获。因鱼不咬钩，小侄子就拿着竿和鱼护不知到哪儿去了。

钓到下午4点多钟，我们每人只有三五条小鲤鱼的收获，小侄子却提着半护肥嘟嘟的大鲫鱼回来了，

足有10千克重。小侄子说是在北边一个小沟汊里钓的，里面还有一个废弃的大拉网，就连浮漂都立不起来。我一听就知道小侄钓鱼的地方，是库主把一个大破网放在那儿，网都快到两边了，北边是10多棵被水淹没二三十厘米的杨树，因我去年在这儿钓过一次鱼，能钓鱼的地方水深也就在半米左右，没想到却能钓获这么多大鲫鱼。

4月4日，气温8~24摄氏度，南风3~4级，我们一行4人到鸡关峪水库钓鱼。因各人的经验不同，选择的钓点也不同。我看中了一葫芦形的小湾子，这个小湾子三面是地，面积大约在250平方米左右，和大大水面相通的是一个宽约五六米的葫芦口，湾子外是深水，湾子内水很浅，最多不超过1米深。这个小湾以前栽过树，现只剩下二三十个脸盆粗的树桩，有的还露出水面。我使用3.3米手竿，0.8号主线，0.5号子线，2号金袖钩，配一支20厘米长的小型浮漂，空钩半水调4目钓1.5目，钓点选在3个树桩中间，水深只有0.6米。其他3位钓友在一个深2.5米的沟汊里下竿，之所以在此下竿，是因为前几天气温低时，在这儿都钓获十余尾大鲫鱼。钓到下午4点30收竿，我钓获清一色的鲫鱼78尾，比他们3位的总和还多。

以上这几个经典“战例”，都是在不起眼的边角旮旯处获得了丰收。为什么这些看不上眼的地方反而有鲫鱼咬钩，而在经常有人钓鱼、水位比较深一些、位置也好的地方反而钓不上多少呢？

经过分析：这些边角旮旯处之所以有鲫鱼咬钩，是天气原因造成的。不难看出，这几次钓鱼都是晴好天，气温偏高，刮南风或是西南风的天气。在阳光的照射下，浅水处升温快。而鲫鱼又是冷血变温性鱼类，其体温基本和水温保持一致，有追温的良好习性，哪儿水温高它们就游到哪儿去，趋温性促使鲫鱼来到浅水区取暖、晒太阳和寻找食物。

再就是这些边角旮旯处水位比较浅，在阳光的照射下，水温上升快，因水温比较高的原因，聚集了大量微生物、浮游生物和各种水生昆虫等食物，在食物相对缺少的春天，高温和食物对鲫鱼的吸引力是非常大的。这些边角旮旯都很偏僻、清静，少了人为因素的干扰，再就是避风，受地形、陡坡和水中杂物的影响，基本属于静水。而不像其他地方，受刮风、温差等作用的影响，常常是水底暗流不断，致使上下水层转换，导致水温一段时间热一段时间冷而不稳定。这些边角旮旯处就不同了，因地处偏僻，基本不受这些外来因素的影响，水温较高不说，还比较稳定，是有大量鲫鱼来这儿取暖、觅食并滞留的关键因素。

在这些地方钓鱼，使用的基本是红虫和蚯蚓，就是使用素饵，也是使用腥香型饵料，并加入大量的南极虾粉来增加腥味和蛋白质含量，这些富含动植物蛋白质的饵料，是春季鲫鱼所必须的食物。多种因素加

在一起，使这些边角旮旯之处形成了局部小气候和食物链，有鱼咬钩就是必然的结果。

所以说，在钓鱼时，如果中上午的气温较高，原钓点又少有鱼咬钩时，就要去寻找这些不起眼的边角旮旯处下竿，也许钓有所获哦！



摄影/瞿高兴

